

RASTREADOR DE SEROCONVERSIÓN DE PrEP

Sexo al nacer (consulte los códigos)	Género (consulte los códigos)	Edad	Categorías de población clave (consulte los códigos)	Última prueba VIH negativa (dd/mm/aaaa)	PrEP iniciada (dd/mm/aaaa)	Última visita de seguimiento de PrEP (dd/mm/aaaa)	Último resurtido de PrEP proporcionado (dd/mm/aaaa)	Síntomas agudos del VIH (Sí/No)	Síntomas agudos del VIH (consulte los códigos)	Diagnóstico VIH positivo (dd/mm/aaaa)	Tipo/nombre de prueba de VIH	Vinculado a la atención del VIH (Sí/No)	Número de clínica de TAR	TAR iniciado (dd/mm/aaaa)	Notas/comentarios	

Sexo al nacer (consulte los códigos)	Género (consulte los códigos)	Edad	Categorías de población clave (consulte los códigos)	Última prueba VIH negativa (dd/mm/aaaa)	PrEP iniciada (dd/mm/aaaa)	Última visita de seguimiento de PrEP (dd/mm/aaaa)	Último resultado de PrEP proporcionado (dd/mm/aaaa)	Síntomas agudos del VIH (Sí/No)	Síntomas agudos del VIH (consulte los códigos)	Diagnóstico VIH positivo (dd/mm/aaaa)	Tipo/nombre de prueba de VIH	Vinculado a la atención del VIH (Sí/No)	Número de clínica de TAR	TAR iniciado (dd/mm/aaaa)	Notas/comentarios

VARIABLE

Sexo al nacer

Género

Edad

Categorías de población clave (KP)

Última prueba VIH negativa (dd/mm/aaaa)

PrEP iniciada (dd/mm/aaaa)

Última visita de seguimiento de PrEP (dd/mm/aaaa)

Último resurtido de PrEP proporcionado (dd/mm/aaaa)

Síntomas agudos del VIH (Sí/No)

Síntomas agudos del VIH (consulte los códigos)

Diagnóstico de VIH positivo (dd/mm/aaaa)

Tipo/nombre de prueba de VIH

Vinculado a la atención del VIH (Sí/No)

Número de clínica de TAR

TAR iniciado (dd/mm/aaaa)

Notas/comentarios

INSTRUCCIONES Y PAUTAS PARA VARIABLES

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES

Sexo del usuario al nacer (consulte los códigos)

Género autoidentificado del usuario. Puede ser diferente del género al nacer. El usuario se puede identificar con género masculino (M), femenino (F) o transgénero (TG) (consulte los códigos). (TG se puede identificar de masculino a femenino [MTF] o femenino a masculino [FTM]; clasifique MTF y FTM como TG).

Edad actual del usuario en el último cumpleaños en años

Categoría de KP del usuario como se refleja en el registro de PrEP del usuario. Las categorías incluyen: hombre que tiene relaciones sexuales con hombres, trabajadora sexual, persona que se inyecta drogas, persona transgénero, persona en prisión y otros grupos (consulte los códigos). Incluya todos los grupos que se aplican al usuario.

Fecha de la última prueba de VIH negativa del usuario en la clínica.

Fecha en que el usuario comenzó a tomar medicamentos de PrEP (no en la visita de seguimiento)

Fecha de la última visita de seguimiento de PrEP del usuario en esta clínica antes de la identificación de la seroconversión (no de la visita de hoy)

Fecha más reciente en que el usuario recibió su medicamento de PrEP en esta clínica (no en la visita de hoy)

Sí o No si el usuario experimentó algún síntoma de infección aguda por VIH (AHI) desde su última cita de seguimiento o prueba de VIH. Esta es la fase temprana de la enfermedad del VIH que se caracteriza por un estallido inicial de viremia. Esta infección se desarrolla en días a semanas después de que la persona se infecta con el VIH y experimenta síntomas "similares a los de la gripe".

Si el usuario experimentó algún síntoma de AHI, como fiebre, fatiga, sarpullido, etc., documente todos los síntomas que el usuario informó mediante los códigos.

Fecha en que la prueba de VIH del usuario dio positivo.

Tipo o nombre de la prueba de VIH utilizada para evaluar al usuario (es decir, Determine, Unigold, ELISA, etc.)

Sí o No si el usuario estaba vinculado a la atención del VIH.

Si el usuario estaba vinculado a la atención del VIH, ingrese el número de identificación de la clínica de terapia

Fecha en que el usuario inició el tratamiento antirretroviral para el tratamiento del VIH.

Cualquier nota o comentario adicional de la persona que complete el Rastreador de seroconversión que sea importante para la seroconversión del usuario (es decir, la adherencia autoinformada del usuario a la toma de medicamentos de PrEP, la omisión de dosis de PrEP o una visita de seguimiento; cualquier intento de participación y vinculación con el usuario, etc.)



Códigos

M = Masculino/F = Femenino/O = Otro/Sin respuesta

M = Masculino/F = Femenino/TG = Transgénero/O = Otro/Sin respuesta

MSM = Hombre que tiene relaciones sexuales con hombres/SW = Trabajadora sexual/PWID = Persona que se inyecta drogas/TG = Persona transgénero/PP = Persona en prisión/O = Otro (especifique)/Ninguno

T = Fiebre o temperatura/F = Fatiga/G = Síntomas de GI/W = Pérdida de peso/S = Erupción cutánea/U = Úlceras en la boca o genitales/H = Dolor de cabeza/M = Mialgia o dolores musculares/L = Ganglios linfáticos inflamados/P = Faringitis o dolor de garganta/A = Artralgia o dolor en las articulaciones/N = Sudores nocturnos/O = Otros (especifique)

tro (especifique)

a antirretroviral (TAR) del usuario.

